


H7N9 禽流感病例诊断标准公布

发病前一周接触过禽类者为高危人群

2013-4-12 厦门日报



有疫情地区人感染 H7N9 禽流感早检早治流程图

中国网 4 月 11 日讯（张艳玲）中国近日修订《人感染 H7N9 禽流感诊疗方案》，方案指出 H7N9 禽流感病毒疑似病例和确诊病例的诊断标准。从患者呼吸道分泌物标本中分离出 H7N9 禽流感病毒，或 H7N9 禽流感病毒核酸检测阳性，可作出人感染 H7N9 禽流感的诊断。

根据流行病学接触史、临床表现及实验室检查结果，可作出人感染 H7N9 禽流感的诊断。在流行病学史不详的情况下，根据临床表现、辅助检查和实验室检查结果，特别是从患者呼吸道分泌物标本中分离出 H7N9 禽流感病毒，或 H7N9 禽流感病毒核酸检测阳性，或动态检测双份血清 H7N9 禽流感病毒特异性抗体水平呈 4 倍或以上升高，可作出人感染 H7N9 禽流感的诊断。

流行病学史。发病前 1 周内与禽类及其分泌物、排泄物等有接触史。

疑似病例：甲型流感病毒抗原阳性

符合上述临床表现，甲型流感病毒抗原阳性，或有流行病学接触史。

确诊病例：呼吸道分泌物标本中分离出 H7N9 禽流感病毒

符合上述临床表现，或有流行病学接触史，并且呼吸道分泌物标本中分离出 H7N9 禽流感病毒或 H7N9 禽流感病毒核酸检测阳性或动态检测双份血清 H7N9 禽流感病毒特异性抗体水平呈 4 倍或以上升高。

重症病例：肺炎合并呼吸功能衰竭或其他器官功能衰竭者为重症病例。

中国官方 10 日晚再次发布人感染 H7N9 禽流感诊疗方案，并明确在发病前一周内接触过禽类者为感染 H7N9 禽流感病毒高危人群，例如从事禽类养殖、贩运、销售、宰杀、加工业等人员。

根据流感的潜伏期及现有 H7N9 禽流感感染病例的调查结果，疾病潜伏期一般为 7 天以内。